

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 11-9-75083817

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

50 FRs

BULLETIN N° 37 - 8 SEPTEMBRE 1975.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.

CULTURES FRUITIÈRES

Dans la plupart des cas, aucune capture n'a été enregistrée depuis le 25 août. Les éclosions larvaires correspondant aux pontes déposées jusqu'à ces dernières dates viennent de se terminer. Toutefois localement, les captures, bien qu'en diminution, se poursuivent. Les températures restant favorables, des éclosions larvaires vont donc se produire jusque vers le 20 septembre. Ces éclosions devraient être relativement faibles et ne devraient constituer un danger que dans les vergers où les dégâts dus au premier vol n'étaient pas négligeables ou dans ceux situés à proximité d'arbres fruitiers à pépins non ou mal traités.

ANTHONOME DU POIRIER : cet insecte est très rare dans la région. Un traitement, à effectuer vers le 20 septembre, ne peut concerner que les vergers habituellement attaqués.

CULTURES LEGUMIÈRES

TEIGNE DU POIREAU : de nouvelles sorties se produisent actuellement. Si les conditions climatiques restent favorables, des pontes pourront être déposées ce qui risque d'entraîner des éclosions larvaires au moins jusqu'à la fin de la 2ème décennie de septembre.

ROUILLE DU POIREAU : l'extension de cette maladie peut être freinée par des traitements avec : Manèbe 160 g, Propinèbe 210 g, Mancozèbe 240 g de m.a./hl. Ces produits sont d'ailleurs efficaces contre plusieurs maladies d'automne des Poireaux.

MALADIES DE LA TOMATE : les dégâts d'*Alternaria* sont variables suivant les cultures. Des taches de Mildiou ont été observées sur tomates palissées tardivement ou non encore palissées. La plupart de ces taches sont desséchées mais certaines peuvent encore être à l'origine de contaminations. Il faudra donc pour le Mildiou, être vigilant si une période humide survient. Captafol, Mancozèbe, Manèbe et Propinèbe sont efficaces vis à vis des deux maladies.

L'Ingénieur et le Technicien chargés des
Avertissements Agricoles
H. SIMON et R. MERLING

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
R. SARRAZIN